

屏東地區造林樹種生長監測及碳吸存效益分析
Study on Carbon Fixation and Growth Monitoring of
the Plantations in Pingtung



委託機關：行政院農業委員會林務局

執行機關：國立臺灣大學

中華民國 100 年 11 月

摘要

本研究運用渦度相關法(Eddy Covariance method)之理論基礎於屏東設立通量觀測塔，監測平地造林地之二氧化碳通量，希望能計算出平地造林地之碳吸存能力，並將在二氧化碳減量上之具體數據估算出來，突顯本研究在全球氣候變遷、碳稅上之重要貢獻。

樣區已進行六次每木調查，試驗地範圍內共計十二種造林樹種。試驗地今年一至十月的平均垂直風速為 -0.067 (m/s) ，由此可見試驗地處於穩定狀態，符合實驗的要求，風向以東北風為主，由地圖判斷屬山風。二氧化碳濃度逐年遞增，今年一至十月平均二氧化碳濃度為 396.92 ppm ，較2010年(393.23 ppm)、2009年(387.52 ppm)及2008年(379.24 ppm)略增，有逐年增加的趨勢，每日二氧化碳濃度變化幅度平均為 49.32 ppm ；其二氧化碳平均通量值為 $-0.357\text{ }\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$ 。從二氧化氮濃度及通量的日夜週期變化，就所得數據換算之二氧化碳固定量，近三年來平均每天每公頃林地可以從空氣中固定約 39.68 公斤 的二氧化碳，換算全造林面積 290.66 公頃 ，則每年約可固定 4209.69 公噸 之二氧化碳。地表淨輻射值逐月增加，到九月才開始下降，於白天日照強烈時可出現最大正值，而夜晚則出現負值，表示地表能量散失；屏東試驗站白天日照強烈時可感熱通量最大值可達 581.928 W/m^2 ，而夜晚逆溫現象發生時有最小值；潛熱通量平均值從三月份 8.220 W/m^2 逐月增加至八月份的 123.427 W/m^2 ，於白天日照強烈時出現最大正值，而夜晚空氣溼度較大時潛熱通量值則會出現負值。

關鍵字：全球氣候變遷、二氧化碳通量、渦度相關法、碳吸存量

Abstract

Based on the theory of Eddy Covariance method, flux monitoring towers were established in Pingtung, in order to monitor the CO₂ flux of the reforestation on the plain, with the hope that we can calculate the capacity of carbon storage of there forestation on the plain, and the realistic figures in the reduction of CO₂ emission thereof. We sincerely hope that this study would provide some contribution to the carbon tax involved in the global climate change.

Up to the present, 6 complete enumerations have been carried; there are 12 tree species in the experimental plots. From January to October of 2011, northeast wind is the prevailing wind direction in the experimental plots, with an average wind aped of -0.067 m/s, therefore the experimental plots are under stable conditions, which meet the requirements of this study. The CO₂ Concentrations of each month in the experimental plots increase during night time, and reach the maximum concentration around 5 AM, and decrease gradually during day-time and reach the minimum concentration around noon-time or right after it. The average atmospheric CO₂ Concentration increases progressively year by year(379.24, 387.52, 393.23, 396.92 ppm), and the daily variation of CO₂ Concentration of 49.32 ppm. the average CO₂ flux is -0.357 μ mol/m²/s. According to the CO₂ Concentration and the day and night cyclic variation in CO₂ flux, we can calculate the carbon storage capacity of forest, on the average, each ha of forest can absorb 39.68 kg of CO₂ from the air daily or the total experimental plots can sequester 4209.69 metric ton of CO₂ each year. The net radiation increases from January to September of 2011. And reaches the maximum positive value during the day time with great solar intensity, and reaches negative value during night time indicating the dissipation of energy. The mean sensible heat flux reaches the maximum value during day time with maximum solar intensity and reaches the minimum value during night time when the temperature inversion phenomenon happens. The average latent heat flux is 8.220 W/m² in March of 2011, which increases to 123.427 W/m² in August, and reaches the maximum value during day time with maximum solar intensity, and approaches negative value during night time with increased atmospheric moisture content.

Keywords: Global climate change, Carbon dioxide flux, Eddy covariance method, the amount of carbon sequestration.

目錄

摘要.....	1
Abstract.....	2
一、前言.....	4
二、材料與方法.....	5
三、結果與討論.....	9
四、結論.....	22
五、參考文獻.....	23
附錄一、各樹種生長基本資料.....	25
附錄二、風向及風速基本資料.....	27
附錄三、大氣二氧化碳濃度資料.....	28
附錄四、微氣候基礎資料.....	30
附錄五、歷年二氧化碳濃度資料	35
期中審查意見回覆.....	36

一、前言

近年來因氣候變遷造成極端氣候出現頻度增加，許多氣候異常現象造成人類生存上的危機，造林減碳政策是全世界目前最重要的工作。平地造林除滿足平地景觀、綠化、淨化、美化環境之功能外，更能發揮減少大氣中CO₂濃度之功能、提供碳稅、減緩氣候變遷之影響。

隨著全球環境變遷課題的日益重要，建立連續且長期監測地表二氧化碳、水氣、及可感熱(sensible heat)流通量(flux)的觀測站也愈趨需要。利用渦度相關法通量測量地面層與大氣CO₂交換已是近年來全球性研究課題 (Yu *et al.*, 2006)。這些觀測站所獲得的數據也是研究區域氣候、水文、及生態的重心。

美國航空及太空總署於1998 年決定支助建立全球性的地表二氧化碳、水氣、及熱能流通量的監測網，稱為fluxnet。 Fluxnet主要結合數個區域性監測網，分別是位於北美及南美的AmeriFlux 在1996 年成立，歐洲的CarboEuroFlux 也於2004 年成立，在澳洲和紐西蘭有OzFlux 監測網，而加拿大地區的監測網為Fluxnet - Canada，非洲地區的CarboAfrica 是在2006 年由歐盟設立，而亞洲的AsiaFlux 在1999 年成立，韓國也於2002 年起成立其觀測網KoFlux，中國大陸的ChinaFLUX 也於2002 年成立。根據fluxnet網站公布的資料顯示，全球已超過500個觀測站，分布範圍從南緯30度至北緯70度，遍布五個大陸的針葉林、闊葉林、熱帶林、草地、農田、北方森林、凍原、濕地等生態系。各觀測站點都以渦度相關技術為主體對植被一大氣間的二氧化碳、水氣、能量通量以及生態系統水碳循環的關鍵過程進行長期和連續性的觀測（資料來源：<http://www.fluxnet.ornl.gov>）。鑑於此課題的重要性，台灣應速建立起自己的觀測站，獲取觀測值，分析其區域特性，並加入Fluxnet 監測網。

國內平地景觀造林政策自民國90年8月31日經行政院核定，民國91年1月1日開始執行，預定至民國96年12月31日總共造林 25,100公頃。至民國94年底止，平地造林面積為8,010公頃，平地造林除了有國土保安、資源保育、景觀維護、維護生物多樣性之存續效應外，造林木可從空氣中吸收二氧化碳、改善大氣組成，降低溫室效應，正是減低二氧化碳最環保、最低成本與最有效的方法，平地景觀造林政策是臺灣配合京都議定書，善盡地球村一份子的責任，監測評估平地造林地二氧化碳通量之變化，提昇我國友善環境的形象。

本研究運用渦度相關法(Eddy Covariance method)之理論基礎於屏東地區台糖公司造林地設立通量觀測塔，監測平地造林地之二氧化碳通量，希望能計算出平地造林地之碳吸存能力，並將政府近年來推動平地造林政策在二氧化碳減量上之具體數據估算出來，突顯本研究在全球氣候變遷、碳稅上之重要貢獻。

二、材料與方法

1. 試驗樣區位置

本試驗觀測站設置於屏東縣新埤鄉海豐段 176 號，該區段屬台灣糖業股份有限公司屏東區處萬隆農場，合計總面積約為 290.66 ha。平地景觀造林開始於民國 91 至民國 94 年止，於萬隆農場 25 個區塊中共計栽植 14 個樹種，栽植密度每公頃 1500 株，共計栽植 435,990 株造林木，各區塊詳細造林樹種、樹種基本資料詳如(附錄一)。

觀測站架設於 8 號地東北角的觀測塔，可觀測範圍約為 1 平方公里，涵蓋範圍主要為萬隆農場 3、4、8、9 號地，以及此四區塊周圍的 2、5、7、10、11 號地等五個區塊，因此觀測塔所測得的二氧化碳通量資料主要為 2、3、4、5、7、8、9、10、11 號地等九個區塊（圖 1）。於觀測塔周邊鄰近 9 個區塊，依各區塊面積大小，系統取樣 3% 設置樣區，共設置 73 個 0.05 公頃(20x25cm)樣區，樣區面積共 3.65 公頃，對個樣區進行每木調查，測量樹高、胸徑、冠幅及枝下高，以了解試驗地林木基礎狀況。




圖 1 萬隆農場 25 區塊分佈位置圖及造林年度，橘色方塊觀測塔位置，圓框為直徑 1 公里的範圍，代表渦度相關法可觀測之範圍(背景地圖摘自經建版台灣地區二萬五千分之一地形圖)。

2.研究方法

(1)渦度相關法(eddy covariance method)

渦度相關法(eddy covariance method)是微氣候學的一種研究方法，目前是通量監測中公認最準確的方法，同時此法具有連續觀測及具有大尺度範圍之代表性的優點(Jung et al., 2010)。國內外許多長期通量觀測站都使用渦度相關法直接量測生態系中二氧化碳、水氣、熱通量等數值。渦度相關是指某物質的垂直通量，即此物質濃度與其垂直速度之共變異數(協方差，covariance)，因此二氧化碳在單位體積空間內濃度的變化率等於二氧化碳在垂直方向的通量。大氣邊界層中之熱、水氣、動量及其他質量的傳輸，主要是由紊流主導，因此二氧化碳、可感熱、潛熱通量可用下式求得(宋霞等，2004；賴政君，2007；Wang and Davis, 2008)：

A.可感熱通量

$$H = \rho C_p \overline{w't'}$$

H 為可感熱通量(W/m^2)

ρ 表示空氣密度($= 41.1 \text{ mol}^{-3}$)

C_p 是比熱容($= 29.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

$w't'$ 表示溫度垂直紊流通量

B.潛熱通量

$$LE = L_v \overline{w'q'}$$

LE 為潛熱通量(W/m^2)

L_v 為水的汽化熱($= 2,450 \text{ J/g}$)

$w'q'$ 表示水氣垂直紊流通量

C.二氧化碳通量

$$F_{CO_2} = \overline{w'c'}$$

F_{CO_2} 為二氧化碳通量($\text{mmole/m}^2\text{s}$)

$w'c'$ 二氧化碳垂直紊流通量。

當觀測環境滿足以下三個大氣條件時：一、大氣觀測環境需為穩定狀態，二、水平均質的碳源、碳匯，三、大氣的下墊面為平坦地形，生態系各通量值可由三維風速計與紅外線氣體分析儀監測數據求得(宋霞等，2003；夏禹九等，2005；Desjardins et al., 2008；Tsai et al., 2008)。

(2) 涡度相關系統

本觀測塔以渦流相關系統 (eddy-covariance system)：包含開放式紅外線氣體分析儀 (LI-COR/LI-7500 open-path infrared gas analyzer) 與三維音波風速計 (CAMPBELL/CSAT3 three-dimensional sonic anemometer) 等，觀測二氧化碳通量值，同時觀測平地造林地之熱通量值，作為修正二氧化碳通量值之依據。另配合各項氣象監測儀器以瞭解樣區之試驗背景資料。




圖 2 涡度相關系統與微氣候監測儀器架設高度示意圖。

(3) 資料處理

渦度相關系統之三維風速、氣溫、二氧化碳及水氣含量的取樣頻率為10 Hz，每30 分鐘計算並記錄一筆平均值資料。量測生態系二氧化碳、水氣、熱通量，取得原始資料，而利用渦度相關法量測通量需符合三項基本假設：觀測地點需為地勢平坦之處、水平均勻地表存量分佈(horizontal homogeneous)、以及在某一段時間內流況為穩態(steady state)。因此大氣條件不符合的情況下，會出現錯誤的數據，需先將錯誤的量測數據除去，透過三維音波風速計所測得的資料，渦度相關系統會對資料進行初步處理，再以剩餘的原始資料，每30 分鐘取一次平均值，代表某時間點的通量值，若是原始資料錯誤筆數過多，則需對儀器進行調校(Sun et al., 2006)。

然而大氣的空氣密度與一些較小的組成成份(如CO₂ 或水氣等)，都會影響量測到的紊流通量值，前人實驗結果發現，誤差最高甚至可達到10%，根據表面能量守恆定律，地表淨輻射量(R_n)是所有表面能量來源：部分能量提供地表熱能，稱作可感熱通量(H_s)；有些則成為水氣蒸發散的能量，形成潛熱通量(LE)；其他由土壤吸收變成土壤熱通量(G) (Guan et al., 2006; Klemm et al., 2006)。因此可用(式4)來判定通量值是否有誤：

$$R_n = H_s + LE + G \quad (4)$$

因此當 $H_s + LE + G \geq 1.2 * R_n$ 時，該筆資料可判定為錯誤資料，又由於土壤熱通量(G)數值比潛熱通量(LE)與可感熱通量(H_s)小很多，所以也可用(式5、式6)來判定：

$$H_s > R_n + 50 \quad (5)$$

$$LE > R_n + 50 \quad (6)$$

因此原始通量資料可用式4、5、6 將錯誤資料去除，再以其餘資料計算平均值，若錯誤資料過多，則該筆資料（30分鐘平均值）判定為錯誤資料。經過資料處理，量測到的通量值可能出現資料缺失(gap)，此時可用二氧化碳通量值與地表淨輻射量兩項資料求出回歸式進行資料補遺 (gap filling) 。

三、結果與討論

1. 每木調查

搭配屏東二氣體通量觀測站設立，於2008年初開始每半年進行一次每木調查，至今已進行6次每木調查，測量樹高、胸徑、冠幅及枝下高，以了解試驗地林木基礎狀況及生長情形，2008年初調查樣木約4,200株。

試驗地範圍內共計12種造林樹種，於民國91、92年間造林，造林密度為每公頃1,500株，平均樹高以苦楝、桃花心木最高，樹高超過6m，最高單株可超過13m，而胸徑平均一年可增加0.7cm至3cm，目前平均胸徑最大為欖仁及茄苳，超過9cm，但最大胸徑為苦楝的26.8cm，若以胸徑增長量來看，楓香及台灣櫸的胸徑增長量最大(表1)。調查初期大部分造林地尚未鬱閉，經過三年，大部分造林地已鬱閉，或接近鬱閉。

大部分樹種樹冠幅有逐漸增長的趨勢，但受季節性落葉影響而有所變動，冬季冠幅有些微下降趨勢。枝下高大致上變化不大，但有人為修枝的區域枝下高明顯增加。

表1 屏東試驗地各樹種歷年生長資料平均值

樹種	樹 高(m)			胸 徑(cm)			冠 輻(m)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
土肉桂	1.75	3.53	4.55	1.76	5.39	6.89	1.23	2.47	2.45
水黃皮	2.55	2.60	2.70	4.05	4.60	5.66	1.60	1.90	1.89
台灣櫸	2.74	3.78	4.33	3.13	3.80	5.78	2.04	2.06	3.30
光蠟樹	2.90	3.47	4.20	3.20	4.06	5.34	1.60	2.14	2.39
印度紫檀	4.26	4.94	5.93	6.37	7.26	8.43	2.48	3.05	3.41
波斯皂莢	4.33	5.24	6.25	5.76	6.65	7.61	1.92	3.51	2.92
茄苳	2.78	3.24	3.90	5.35	6.98	9.08	2.29	2.46	2.9
苦楝	5.10	6.05	6.92	5.94	7.52	8.37	2.63	3.21	4.08
桃花心木	4.18	5.61	6.52	4.51	6.24	7.54	1.34	1.66	1.95
無患子	2.79	3.70	4.54	2.83	4.01	5.33	1.35	2.02	2.14
楓香	2.45	3.37	5.25	2.76	3.72	6.56	1.39	1.67	2.85
欖仁	3.61	4.82	6.20	6.50	8.13	9.35	3.23	3.78	4.47

試驗地經歷 2009 年莫拉克及 2010 年凡那比颱風侵襲後，許多造林木風折或風倒，2010 年 8 月調查結果樣區內樣木約 3,800 株，較 2008 年減少約 400 株，5 號地的土肉桂造林木有許多遭人為截幹，樣區內死亡率達 14.55%，樣區內以台灣櫟造林木的死亡率最高，達 22.17% (表 2)。

表 2 試驗地各樹種 2010 年 8 月調查株數及死亡率

樹種	株數	死亡率
土肉桂	47	14.55%
欖仁	478	2.65%
水黃皮	11	0.00%
光臘樹	419	3.68%
印度紫檀	897	3.03%
波斯皂莢	145	0.68%
苦棟	418	1.18%
茄苳	31	3.13%
桃花心木	418	5.86%
無患子	283	4.71%
楓香	24	0.00%
櫟木	632	22.17%


2. 平地造林地通量監測

以渦度相關法進行二氧化碳通量觀測具有非破壞性、連續觀測、及較大區域(大尺度，100 m – 2 km)代表性之優點，不過需依賴穩定狀態、水平均質的碳源與碳匯、與平坦的下墊面，將渦流三維的傳輸過程簡化為一維方向的傳輸過程，而穩定狀態需在一段時間(通常為 30 分鐘)內之平均垂直風速為零。

而一月至十月試驗地的平均垂直風速數值相當小，平均值為 -0.067 m/s，負號表示向下，因此可發現試驗地處於穩定狀態，符合渦度相關法的前提假設，而平均風速為 1.131 m/s(表 3)。四月至十月風向以東北風為主(圖 3)，由地圖判斷屬山風，且穩定地在夜間發生，但日間風速仍較夜間風速大，九、十月東北風發生頻度增加。

表 3 2011 年觀測站風速基本資料(m/s)

月份	平均水平風速	最大水平風速	平均垂直風速
一月	1.250	5.50	-0.023
二月	1.399	5.80	-0.045
三月	1.406	7.60	-0.038
四月	1.273	9.10	-0.033
五月	1.265	7.80	-0.044
六月	1.176	6.60	-0.078
七月	0.977	7.50	-0.094
八月	1.035	6.50	-0.122
九月	0.882	3.90	-0.116
十月	0.644	10.30	-0.082
平均	1.131	-	-0.067






圖 3 觀測站 2011 年 1 月至 10 月風向圖(%)

3. 平地造林地之二氧化碳通量

本試驗地各月份 CO₂ 濃度值雖不相同，但皆在夜間上升，於清晨 5 點左右達最高濃度，並在白天逐漸下降，於中午或午後達最低濃度，但一月到五月乾季期間二氧化碳日變化趨勢較緩(圖 4)，由表 4 可知一至十月大氣平均二氧化碳濃度為 396.92 ppm，較 2010 年(393.23 ppm)、2009 年(387.52 ppm)及 2008 年(379.24 ppm)略增，顯示本試驗地大氣二氧化碳濃度有逐年上升的趨勢。每日二氧化碳濃度變化幅度平均為 49.32 ppm，在一至十月期間二氧化碳濃度日平均變化量以一月的 29.44 ppm 最低，而七月有最大日變化量 75.22 ppm (表 4)。

表 4 屏東試驗地 2011 年 1 月至 10 月大氣平均二氧化碳濃度(ppm)

月份	平均值	最大值	最小值	日平均變化量
一月	404.82	455.65	364.46	29.44
二月	393.39	483.76	331.22	39.64
三月	378.92	498.75	336.81	41.30
四月	392.96	504.97	364.76	36.81
五月	398.64	484.81	361.16	51.79
六月	393.63	496.35	358.69	60.03
七月	398.89	488.07	351.86	75.22
八月	397.81	490.08	359.66	30.64
九月	400.02	497.36	360.21	61.47
十月	410.09	491.10	361.70	66.87
平均值	396.92	—	—	49.32




圖 4 屏東觀測站 2011 年各月份大氣二氧化碳濃度日變化。

由表 5 得知試驗地二氧化碳通量平均值為 $-0.357 \mu\text{mol/m}^2/\text{s}$ ，各月份平均二氧化碳通量值略有不同，但在 2 - 4 月為碳排放，5 月雨季開始後轉為碳吸存，推測降雨可能為影響本試驗地造林木固碳的重要因子。

表 5 屏東試驗地 1 月至 10 月二氧化碳通量值。

月份	平均值 ($\mu\text{mol/m}^2 \text{s}$)	平均碳吸存量 (kg/ha day)
一月	-0.114	4.3
二月	0.600	-22.8
三月	0.379	-14.4
四月	0.852	-32.4
五月	-0.532	20.2
六月	-2.074	78.9
七月	-1.755	66.7
八月	-1.223	46.5
九月	-0.075	2.8
十月	0.398	-15.2
總平均值	-0.357	13.55

植物體透過光合作用吸收大氣中二氧化碳，而淨光合作用受許多環境因子影響，其中太陽輻射量為光合作用最主要的能量來源，而植物體周遭的溫度會影響呼吸作用，使淨光合作用值變動，植物體蒸散作用與水分利用息息相關，也影響光合作用速率，因此利用能量守恆定律，太陽輻射到達地表的淨輻射量(R_n)是所有表面能量來源：部分能量提供地表熱能，稱作可感熱通量(H_s)，會影響地表周圍的溫度；部分則成為水氣蒸發散的能量，形成潛熱通量(LE)；其他由土壤吸收變成土壤熱通量(G)。

$$R_n = H_s + LE + G$$

若等式兩側數值相差太大($H_s + LE + G \geq 1.2 * R_n$)，則表示儀器觀測值錯誤，該時間點之二氧化碳通量值也為錯誤數值，搭配公式可將大部分錯誤值去除。

表 6 2011 年屏東試驗地各月份可感熱通量、潛熱通量、土壤熱通量及淨輻射量之平均值、最小值及最大值

月份	項目	平均值	最小值	最大值
一月	$H_s(W/m^2)$	33.560	-90.614	464.241
	$LE(W/m^2)$	14.410	-63.610	141.456
	$G(W/m^2)$	-2.217	-23.180	53.930
	$R_n(W/m^2)$	65.073	-94.051	786.186
二月	$H_s(W/m^2)$	53.196	-67.748	460.378
	$LE(W/m^2)$	10.116	-85.636	104.863
	$G(W/m^2)$	0.732	-24.590	64.120
	$R_n(W/m^2)$	123.424	-96.248	828.520
三月	$H_s(W/m^2)$	48.176	-75.226	553.160
	$LE(W/m^2)$	8.220	-117.126	175.116
	$G(W/m^2)$	-0.696	-25.720	72.150
	$R_n(W/m^2)$	107.174	-77.640	999.214
四月	$H_s(W/m^2)$	56.540	-70.806	581.928
	$LE(W/m^2)$	25.119	-93.304	239.404
	$G(W/m^2)$	0.871	-39.170	80.800
	$R_n(W/m^2)$	143.308	-89.478	1083.016
五月	$H_s(W/m^2)$	47.267	-59.431	506.665
	$LE(W/m^2)$	48.553	-154.404	422.182
	$G(W/m^2)$	0.455	-18.710	84.100
	$R_n(W/m^2)$	159.509	-77.675	1136.916
六月	$H_s(W/m^2)$	35.547	-126.036	483.558
	$LE(W/m^2)$	104.029	-178.911	579.728
	$G(W/m^2)$	0.456	-41.020	71.740
	$R_n(W/m^2)$	214.023	-96.998	1137.525
七月	$H_s(W/m^2)$	8.841	-97.762	234.899
	$LE(W/m^2)$	106.785	-379.494	794.471
	$G(W/m^2)$	0.095	-19.000	48.460
	$R_n(W/m^2)$	173.716	-75.683	1134.342
八月	$H_s(W/m^2)$	19.607	-78.079	263.649
	$LE(W/m^2)$	123.427	-147.166	682.928
	$G(W/m^2)$	-1.329	-13.600	28.110
	$R_n(W/m^2)$	190.954	-74.485	1164.173

	H_s (W/m ²)	2.129	-89.361	160.241
九月	LE (W/m ²)	89.497	-208.007	513.572
	G (W/m ²)	-0.214	-13.420	18.290
	R_n (W/m ²)	158.156	-63.168	1035.659
	H_s (W/m ²)	6.919	-88.177	196.704
十月	LE (W/m ²)	74.359	-232.743	433.227
	G (W/m ²)	-2.510	-12.670	15.700
	R_n (W/m ²)	123.878	-76.969	1091.445

分析屏東試驗地之可感熱通量 Sensible heat flux (W/m²)、潛熱 Latent heat flux (W/m²)、土壤熱通量 Soil heat flux (W/m²)及地表淨輻射量數值。地表淨輻射值 (R_n)逐月增加，於白天日照強烈時可出現最大正值，而夜晚則出現負值，表示地表能量散失；屏東試驗站一至十月可感熱通量最大值為 581.928 W/m²；潛熱通量平均值從一月份逐月增加至八月份的 123.467 W/m²，於白天日照強烈時出現最大正值，而夜晚空氣溼度較大時潛熱通量值則會出現負值(表 6)。




圖 5 屏東地區各項通量整合圖(以 2011 年 3 月 4~14 日為例)

植物體光合作用速率生育地因子影響，隨季節轉換太陽輻射增強，2011年各月份月均溫自1月的16.6 °C逐月上升至6月達最高月均溫28.0 °C，最高溫出現在6月為37 °C，土溫增加的趨勢與氣溫相似，相對溼度平均值則是逐月增加，在10月達最高(表7)；基本微氣候資料顯示氣溫、土溫、空氣相對溼度有日週期性變化資料(圖7)，可用於初步判斷各項儀器正常運作，並作為運算時校正的基礎，而雨量資料顯示本試驗地有明顯乾濕季，雨季大約在五月底開始，十月結束，乾季長達七個月(圖6)，2009年8月雨量高峰為莫拉克颱風期間，2010年高峰為凡那比颱風期間。

試驗地造林時間最長之區塊僅有9年林齡，從冠幅及栽植密度評估仍屬未鬱閉林分，長期監測二氧化碳通量可進一步了解鬱閉成林過程平地造林地對二氧化碳固定量的變化。本研究監測時間尚短，但初步所得資料，仍可做為台灣平地造林地二氧化碳通量之代表樣本。




圖6 屏東地區2008-2010年月雨量變化




圖 7 2011 年一月至十月屏東觀測站微氣候資料。

表 7 2010 年屏東觀測站氣溫、土溫、相對溼度之變化

月份	項目	平均值	最大值	最小值
一月	氣溫(°C)	16.56	25.20	9.70
	土溫(°C)	20.48	25.38	17.24
	相對溼度(%)	76.55	92.50	42.00
二月	氣溫(°C)	19.15	29.50	10.60
	土溫(°C)	23.70	31.18	17.81
	相對溼度(%)	69.44	92.50	33.30
三月	氣溫(°C)	20.47	29.40	13.60
	土溫(°C)	25.22	34.92	19.87
	相對溼度(%)	69.74	91.60	43.00
四月	氣溫(°C)	23.46	32.50	17.20
	土溫(°C)	26.90	35.97	20.60
	相對溼度(%)	68.21	91.50	33.20
五月	氣溫(°C)	25.87	34.60	21.30
	土溫(°C)	28.60	35.18	24.55
	相對溼度(%)	78.56	91.80	41.40
六月	氣溫(°C)	28.01	37.00	22.40
	土溫(°C)	29.05	35.85	24.10
	相對溼度(%)	72.40	92.30	35.00
七月	氣溫(°C)	26.96	33.00	23.20
	土溫(°C)	27.99	31.70	25.37
	相對溼度(%)	79.33	92.20	45.50
八月	氣溫(°C)	27.24	34.00	22.80
	土溫(°C)	27.45	29.77	24.34
	相對溼度(%)	78.66	93.10	46.70
九月	氣溫(°C)	26.52	33.10	22.40
	土溫(°C)	26.45	28.14	24.77
	相對溼度(%)	79.78	92.80	51.40
十月	氣溫(°C)	25.40	32.90	20.4
	土溫(°C)	25.89	27.32	24.12
	相對溼度(%)	81.48	93.10	47.80

四、結論

1. 目前樣區已進行6次每木調查，通量塔監測範圍內共計12種造林樹種，合計調查樣木約3,800株，試驗地經歷2009年莫拉克及2010年凡那比颱風侵襲後風倒、風折情況嚴重，另2009年11月至2010年5月試驗地幾乎沒有降雨，有明顯乾季，因此樣木數量較三年前初次調查減少約400株。在今年夏季調查結果在高生長方面無患子增長最多，其次是光臘樹、苦棟、楓香及桃花心木，大部分樹種高生長在冬季過後至夏季之間，而夏季過後至冬季之間高生長較少。平均胸徑以桃花心木、無患子及櫟木增加最多，波斯皂莢及水黃皮最少。樣區內樣木胸徑平均一年可增加0.7~3 cm，調查初期大部分造林地尚未鬱閉，經過兩年多，部分造林地已鬱閉，或接近鬱閉。
2. 2011 年1 月至10 月試驗地的平均垂直風速相當小，平均值為-0.067，因此可發現試驗地處於穩定狀態，符合實驗的要求，而平均風速為1.131 m/s。風向主要以東北風為主，由地圖判斷屬山風，且穩定地在夜間發生。試驗地基本氣象數據與預期結果十分符合，風速風向的基本條件，亦適合本套裝儀器進行監測。
3. 本試驗地各月份CO₂ 濃度值雖不相同，但皆在夜間上升，於清晨5點左右達最高濃度，並在白天逐漸下降，於中午或午後達最低濃度，由表4可知一至十月大氣平均二氣化碳濃度為396.92 ppm，且自2008年至今有逐年增加的趨勢，每日二氧化碳濃度變化幅度平均為49.32 ppm，在一至十月期間二氧化碳濃度平均變化量以一月的29.44 ppm 最低，七月的75.22 ppm最高。
4. 從二氧化碳通量的日夜週期變化，就所得數據換算成二氧化碳固定量，近三年來平均每天每公頃林地可以從空氣中固定約39.68公斤的二氧化碳，樣區160 公頃一天可固碳6.35公噸，換算全造林面積290.66公頃，則每年約可固定4209.69公噸之二氧化碳。此雖僅為粗估，但仍具有參考價值，預期在資料繼續累積後將日趨精準。
5. 分析屏東試驗地之可感熱通量、潛熱、土壤熱通量及地表淨輻射量數值。地表淨輻射值逐月增加，到九月才開始下降，於白天日照強烈時可出現最大正值，而夜晚則出現負值，表示地表能量散失；屏東試驗站白天日照強烈時可感熱通量最大值可達581.928 W/m²，而夜晚逆溫現象發生時有最小值；潛熱通量平均值從三月份8.220 W/m² 逐月增加至八月份的123.427 W/m²，於白天日照強烈時出現最大正值，而夜晚空氣溼度較大時潛熱通量值則會出現負值。
6. 植物體光合固碳速率受生育地因子影響，隨季節轉換太陽輻射增強，月均溫

逐月上升，而土溫也隨之漸增，相對溼度平均值則是逐月增加；基本微氣候資料顯示氣溫、土溫、空氣相對溼度有日週期性變化資料，可用於初步判斷各項儀器正常運作，並作為運算時校正的基礎。

7. 試驗地造林時間最長之區塊僅有9年林齡，從冠幅及栽植密度評估仍屬未鬱閉林分，長期監測二氧化碳通量可進一步了解鬱閉成林過程平地造林地對二氧化碳固定量的變化。本研究監測時間尚短，但所得資料，仍可做為台灣平地造林地二氧化碳通量之參考。

五、參考文獻

- 宋霞、於貴瑞、劉允芬、任傳友、溫學發 (2004) 開路與閉路渦度相關系統通量觀測比較研究。中國科學 D輯34(增刊II) 67-76。
- 宋霞、劉允芬、徐小鋒 (2003) 箱法和渦度相關法測碳通量的比較研究。江西科學 21(3) 207-210。
- 夏禹九、謝正義、張世杰、林佩蓉、賴正偉(2005) 二氧化碳通量測站設置相關成果及未來努力方向。環境資料庫暨空氣品質監測系統建置成果發表會。
- 賴政君 (2007) 以通量變化法估計地表之可感熱、潛熱、以及二氧化碳通量。國立臺灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系碩士論文。
- Desjardins R. L., M. Mauder, E. Pattey and D. Worth (2008) Improvements in measuring carbon dioxide flux using the eddy covariance technique. Proceedings of the international symposium on CO₂ flux monitoring technology. p.1-24.
- Guan, D. X., J. B. Wu, X. S. Zhao, S. J. Han, G. R. Yu, X. M. Sun, C. J. Jin(2006) CO₂ fluxes over an old, temperate mixed forest in north-eastern China. Agric. Forest Meteorol 137:138–149.
- Jung M., M. Reichstein, P. Ciais, S. I. Seneviratne, J. Sheffield, M. L. Goulden, G. Bonan, A. Cescatti, J. Chen, R. Jeu, A. J. Dolman, W. Eugster, D. Gerten, D. Gianelle, N. Gobron, J. Heinke, J. Kimball, B. E. Law, L. Montagnani, Q. Mu, B. Mueller, K. Oleson, D. Papale, A. D. Richardson, O. Roupsard, S. Running, E. Tomelleri, N. Viovy, U. Weber, C. Williams, E. Wood, S. Zaehle and K. Zhang (2010) Recent decline in the global land evapotranspiration trend due to limited moisture supply. Nature doi:10.1038/nature09396.
- Klemm, O., S. C. Chang, Y. J. Hsia. (2006) Energy Fluxes at a subtropical mountain cloud forest. Forest Ecology and Management 224:5-10.
- Sun, X. M., Z. L. Zhu, X. F. Wen, G. F. Yuan, G. R. Yu (2006) The impact of averaging period on eddy fluxes observed at China-FLUX sites. Agric. Forest Meteorol. 137:188–193.

- Tsai J. L., B. J. Tsuang and C. Y. Tu (2008) Characteristics of CO₂ flux over different land types in Taiwan and future field experiment plan of TTFRI. Proceedings of the international symposium on CO₂ flux monitoring technology. p.25-34.
- Wang W. and K. J. Davis (2008) A numerical study of the influence of a clearcut on eddy-covariance fluxes of CO₂ measured above a forest. Agricultural and forest meteorology 148:1488-1500.
- Yu, G. R., X. F. Wen, B. D. Tanner, X. M. Sun, X. H. Lee, J. Y. Chen (2006) Overview of ChinaFLUX and evaluation of its eddy covariance measurement. Agric. Forest Meteorol. 137:125–137.

附錄一 觀測站周圍 9 區塊造林樹種、樹高、冠幅、胸高直徑基本資料。

地號	樹種	樹高(公尺) 平均值±SD	冠幅(公尺) 平均值±SD	枝下高(公尺) 平均值±SD	胸徑(公分) 平均值±SD	樣本數
2 號地	台灣櫸	3.33 ± 1.17	2.34 ± 0.79	0.98 ± 0.44	3.07 ± 1.60	115
	茄苳	3.73 ± 0.65	2.47 ± 0.66	1.30 ± 0.24	6.65 ± 2.84	6
	印度紫檀	5.22 ± 1.18	3.90 ± 1.68	0.88 ± 0.44	8.60 ± 3.23	5
	楓香	3.79 ± 1.11	1.93 ± 0.59	1.21 ± 0.39	4.19 ± 2.01	101
3 號地	欖仁樹	5.27 ± 1.20	3.81 ± 0.96	2.02 ± 0.46	7.58 ± 2.23	229
	苦棟	2.90 ± 0.14	0.40 ± 0.35	2.20 ± 0.28	2.25 ± 0.35	4
	桃花心木	5.52 ± 1.44	1.36 ± 0.41	2.29 ± 0.44	6.02 ± 0.51	260
4 號地	光蠟樹	3.84 ± 1.24	2.23 ± 0.63	1.40 ± 0.47	5.05 ± 2.41	306
	印度紫檀	6.52 ± 1.10	3.01 ± 1.51	2.25 ± 0.43	8.81 ± 2.31	301
5 號地	台灣櫸	3.16 ± 1.05	2.24 ± 1.06	1.09 ± 1.07	3.48 ± 0.39	96
	印度紫檀	4.35 ± 1.34	3.11 ± 1.41	1.42 ± 0.46	7.39 ± 3.11	61
	土肉桂	4.01 ± 1.36	2.26 ± 0.71	1.18 ± 0.48	6.44 ± 3.17	47
	桃花心木	4.17 ± 1.66	1.26 ± 0.56	2.00 ± 0.74	4.79 ± 2.54	18
	無患子	3.60 ± 0.84	1.38 ± 0.68	1.45 ± 0.61	4.45 ± 1.84	79
7 號地	印度紫檀	7.19 ± 1.46	3.26 ± 1.05	2.56 ± 0.50	9.65 ± 3.30	57
	苦棟	5.74 ± 1.44	2.62 ± 1.00	2.23 ± 0.55	6.57 ± 2.61	213

附錄一 觀測站周圍 9 區塊造林樹種、樹高、冠幅、胸高直徑基本資料(續)。

地號	樹種	樹高(公尺) 平均值	冠幅(公尺) 平均值	枝下高(公尺) 平均值	胸徑(公分) 平均值	樣本 數
8 號 地	水黃皮	2.74 ± 0.96	1.87 ± 1.03	1.23 ± 0.55	5.56 ± 2.49	11
	台灣櫟	3.73 ± 1.17	2.45 ± 1.06	1.47 ± 0.43	4.97 ± 2.18	53
	光蠟樹	3.46 ± 1.29	2.02 ± 1.29	1.29 ± 0.86	4.02 ± 1.90	121
	印度紫檀	5.40 ± 3.64	2.58 ± 0.89	1.85 ± 0.60	7.19 ± 2.28	301
	苦棟	4.30 ± 1.42	2.38 ± 1.00	1.52 ± 0.53	5.99 ± 2.71	31
	茄苳	3.62 ± 0.79	2.92 ± 1.08	1.59 ± 0.74	8.70 ± 3.14	27
	桃花心木	5.38 ± 2.01	1.87 ± 0.65	1.66 ± 0.96	6.86 ± 3.02	56
	無患子	2.99 ± 0.84	1.21 ± 0.57	1.32 ± 0.51	3.27 ± 1.28	37
	瓊崖海棠	1.88 ± 0.63	1.03 ± 0.35	0.53 ± 0.42	2.51 ± 1.29	8
9 號 地	印度紫檀	5.75 ± 1.47	2.93 ± 1.02	2.00 ± 0.66	8.67 ± 3.30	103
	波斯皂莢	6.05 ± 1.69	2.85 ± 1.04	1.92 ± 1.20	7.23 ± 2.96	146
	苦棟	9.29 ± 1.92	3.45 ± 1.06	2.43 ± 0.83	11.42 ± 4.08	101
	桃花心木	8.47 ± 2.42	2.13 ± 0.62	2.44 ± 0.76	9.17 ± 2.77	79
	無患子	3.28 ± 0.89	0.61 ± 0.32	1.43 ± 0.59	2.53 ± 0.83	15
	台灣櫟	4.47 ± 3.26	2.81 ± 1.07	1.40 ± 1.04	5.79 ± 0.59	252
	欖仁樹	5.91 ± 1.69	3.64 ± 1.40	2.08 ± 0.73	9.14 ± 3.01	139
10 號 地	光蠟樹	2.75 ± 0.91	1.66 ± 0.51	1.09 ± 0.25	3.09 ± 1.12	8
	無患子	4.28 ± 0.74	1.94 ± 1.72	1.60 ± 1.34	5.12 ± 1.55	152
	台灣櫟	4.10 ± 1.22	2.11 ± 0.85	1.39 ± 1.21	4.95 ± 2.06	101
11 號 地	台灣櫟	3.93 ± 1.20	2.63 ± 0.98	0.96 ± 0.51	4.16 ± 1.95	94
	印度紫檀	4.84 ± 1.69	2.70 ± 1.18	1.08 ± 0.45	5.87 ± 2.71	67
	苦棟	4.55 ± 1.14	1.90 ± 0.72	2.36 ± 0.54	6.13 ± 3.09	70
	無患子	2.84 ± 1.55	1.76 ± 1.38	1.01 ± 0.28	2.68 ± 1.60	8
	欖仁樹	6.55 ± 1.56	4.25 ± 1.08	1.97 ± 0.46	10.05 ± 2.56	110

附錄二 屏東觀測站 2011 年各月份風向平均風速基本資料

方位	角度範圍(度)	平均風速(m/s)									
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
N	348.75-11.25	1.38	1.55	1.72	1.25	2.10	2.15	1.66	1.89	1.41	1.11
NNE	11.25-33.75	1.02	1.14	0.96	0.87	1.05	1.25	1.17	1.67	1.28	1.16
NE	33.75-56.25	1.48	2.04	1.41	1.57	1.49	1.64	1.74	1.79	1.75	1.50
NEE	56.25-78.75	1.15	1.66	1.22	1.32	1.25	1.55	1.57	1.66	1.65	1.36
E	78.75-101.25	1.00	1.01	0.88	0.87	0.84	1.09	1.11	1.64	1.07	0.91
SEE	101.25-123.75	0.98	1.01	0.94	0.83	1.04	1.16	1.17	1.08	1.18	0.85
SE	123.75-146.25	1.18	1.18	1.14	1.14	1.27	1.79	1.63	1.49	1.29	1.05
SSE	146.25-168.75	1.28	1.37	1.33	1.37	1.58	1.86	1.65	1.65	1.41	0.96
S	168.75-191.25	1.15	1.53	1.42	1.47	1.66	2.63	1.29	1.85	1.18	1.11
SSW	191.25-213.75	1.12	1.22	1.00	1.32	1.16	2.11	1.70	2.21	1.44	1.19
SW	213.75-236.25	1.76	2.51	2.31	2.24	1.87	2.66	2.24	2.94	1.89	1.65
SWW	236.25-258.75	1.87	2.52	2.46	2.33	2.20	2.73	2.20	2.77	1.92	1.68
W	258.75-281.25	1.76	2.06	2.12	2.40	2.22	2.21	1.81	1.46	1.71	1.53
NWW	281.25-303.75	1.66	2.12	1.75	2.11	2.03	2.03	1.78	1.72	1.53	1.10
NW	303.75-326.25	1.33	1.90	1.51	1.90	1.92	1.84	1.63	1.48	1.24	1.05
NNW	326.25-348.75	1.20	1.86	1.31	1.84	2.05	2.02	1.62	1.69	1.31	1.04

附錄三 屏東試驗地 2011 年一至十月大氣二氧化碳濃度日平均值

時間	大氣二氧化碳濃度(ppm)									
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
00:00	407.84	393.13	377.03	396.06	407.38	406.39	411.44	414.12	411.89	423.29
00:30	408.98	392.55	379.50	397.42	406.38	402.87	413.30	415.25	412.90	422.92
01:00	409.43	392.26	376.76	397.63	407.68	405.36	413.99	416.39	413.50	421.78
01:30	409.67	392.89	377.45	399.48	409.05	408.24	414.50	415.54	412.05	423.34
02:00	411.33	393.04	379.79	399.50	409.40	410.01	414.10	416.29	414.74	423.48
02:30	411.75	393.81	379.34	398.55	410.77	410.73	413.46	414.17	415.29	425.06
03:00	414.67	394.24	380.06	401.50	409.35	409.41	416.88	417.84	413.37	425.32
03:30	415.38	392.38	376.31	398.48	410.46	407.67	419.04	420.16	410.58	428.60
04:00	414.99	393.66	377.10	399.59	413.56	407.00	419.19	418.97	411.23	425.33
04:30	414.93	394.76	378.56	400.90	410.45	407.65	421.56	418.84	410.04	423.73
05:00	416.20	396.81	382.07	400.48	412.36	408.55	417.38	419.45	410.72	425.00
05:30	415.49	395.18	384.96	401.27	412.24	407.43	416.41	415.92	411.20	426.33
06:00	413.86	395.96	385.33	401.88	411.02	407.39	411.93	415.80	412.82	425.15
06:30	414.62	394.38	384.53	403.22	408.15	402.33	410.81	412.87	410.38	422.52
07:00	414.21	393.25	384.83	401.49	404.16	399.39	405.82	411.09	406.76	419.66
07:30	411.43	396.30	385.95	398.23	401.31	390.81	400.73	397.36	403.37	413.11
08:00	413.43	398.03	386.28	395.64	400.01	391.23	396.03	392.11	393.85	407.60
08:30	411.32	397.40	388.85	393.72	396.46	390.64	393.04	388.83	390.45	401.06
09:00	409.56	395.27	386.16	392.87	394.93	388.68	387.86	385.74	389.69	396.74
09:30	408.76	394.64	384.59	391.97	392.97	385.15	385.29	382.67	384.39	396.53
10:00	406.13	394.22	383.42	391.16	392.96	384.43	383.75	381.30	383.59	393.61
10:30	406.21	393.80	382.84	390.10	388.81	381.03	383.93	379.86	387.28	394.62
11:00	403.75	393.87	383.40	389.83	388.04	384.13	380.89	383.37	382.59	395.15
11:30	401.11	392.29	383.20	389.90	389.02	383.39	382.36	376.14	381.25	396.25
12:00	398.93	391.61	382.06	390.55	389.42	383.40	378.23	380.62	381.77	401.65
12:30	398.55	391.81	380.90	391.47	389.21	383.94	377.29	372.13	385.81	403.46
13:00	397.07	393.53	381.09	390.76	391.41	381.88	385.95	374.73	385.67	398.73
13:30	396.74	395.46	381.63	390.51	390.72	380.52	388.62	373.49	385.24	398.15
14:00	396.26	398.14	381.01	391.49	391.80	379.47	381.02	373.57	386.86	402.72
14:30	396.44	399.33	380.15	391.13	389.16	381.06	387.85	376.59	388.10	396.76
15:00	396.30	398.28	379.50	389.97	389.47	380.15	385.80	378.41	389.17	393.98
15:30	397.20	397.22	377.64	388.77	387.23	379.67	382.57	374.80	385.50	394.19
16:00	396.01	393.60	376.82	386.18	387.91	379.64	378.30	375.13	392.58	391.94
16:30	395.79	392.80	375.38	384.94	387.83	383.54	380.82	380.25	381.74	390.75
17:00	395.32	392.50	373.79	383.59	387.43	380.58	383.28	389.29	390.14	392.25

17:30	395.65	390.82	372.34	383.49	385.84	380.02	383.15	393.76	392.00	395.43
18:00	396.63	391.01	371.71	382.92	387.07	381.31	389.63	390.78	394.67	397.44
18:30	397.80	390.68	371.39	382.59	390.64	384.82	388.44	397.52	397.92	403.32
19:00	399.28	389.80	371.30	383.32	391.52	387.60	391.43	387.78	410.16	411.96
19:30	398.73	389.71	370.85	385.54	392.21	392.10	396.08	390.61	404.36	412.08
20:00	400.06	389.96	370.99	385.95	398.50	391.07	399.15	395.48	401.35	413.62
20:30	401.09	390.38	371.41	387.27	399.83	393.36	410.23	403.31	401.69	416.52
21:00	402.11	390.32	372.83	390.15	400.52	397.85	409.85	402.04	403.48	420.32
21:30	405.45	390.00	375.52	391.32	398.71	399.31	411.14	405.90	408.11	419.77
22:00	406.81	389.95	374.73	393.01	402.50	403.90	412.91	408.10	412.28	419.40
22:30	405.76	390.33	374.44	394.02	402.60	405.93	409.88	406.19	414.02	421.93
23:00	406.83	390.60	375.68	395.30	402.84	406.20	413.10	409.67	412.50	423.27
23:30	406.55	390.28	376.64	395.73	405.34	405.33	411.11	408.73	414.52	420.81
平均	405.26	393.38	378.92	392.93	398.47	393.80	398.95	397.06	399.87	410.35

附錄四 屏東試驗地 2011 年各月份微氣候基礎資料

時間	屏東試驗地氣溫 (°C)										
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	
00:00	15.19	16.38	18.78	21.57	24.48	25.60	25.38	25.58	24.80	23.91	
00:30	15.21	16.24	18.63	21.49	24.29	25.48	25.29	25.45	24.71	23.91	
01:00	15.07	16.05	18.57	21.38	24.27	25.41	25.22	25.30	24.55	23.82	
01:30	15.09	16.04	18.48	21.30	24.20	25.44	25.12	25.20	24.50	23.79	
02:00	14.97	15.92	18.35	21.16	24.18	25.36	25.06	25.09	24.47	23.81	
02:30	14.92	15.78	18.36	21.10	24.09	25.27	25.00	25.04	24.42	23.70	
03:00	14.82	15.66	18.19	21.02	24.05	25.17	24.94	24.97	24.28	23.66	
03:30	14.76	15.58	18.13	20.91	23.93	25.13	24.87	24.91	24.25	23.61	
04:00	14.73	15.63	18.12	20.88	23.91	24.93	24.80	24.84	24.19	23.55	
04:30	14.65	15.48	18.11	20.77	23.91	24.96	24.72	24.82	24.17	23.52	
05:00	14.59	15.46	18.04	20.65	23.82	24.88	24.71	24.79	24.09	23.36	
05:30	14.55	15.39	17.99	20.65	23.83	24.91	24.64	24.69	24.03	23.26	
06:00	14.56	15.15	17.93	20.62	23.96	24.95	24.70	24.72	24.01	23.23	
06:30	14.48	15.49	17.89	20.91	24.46	25.95	25.22	25.22	24.38	23.39	
07:00	14.34	15.60	18.25	21.67	25.09	27.06	26.11	26.06	25.12	23.98	
07:30	14.60	16.13	19.05	22.72	25.77	28.15	26.85	27.08	25.97	24.97	
08:00	15.14	17.09	19.78	23.77	26.48	28.77	27.55	28.12	27.05	26.06	
08:30	15.75	18.20	20.38	24.54	26.93	29.25	28.07	29.06	28.02	26.57	
09:00	16.39	19.57	20.96	25.17	27.26	29.58	28.51	29.57	28.64	27.40	
09:30	17.15	20.57	21.54	25.62	27.83	30.09	28.79	29.97	29.11	27.76	
10:00	18.00	21.03	22.21	26.02	28.09	30.38	29.15	30.39	29.71	28.12	
10:30	18.64	21.82	22.68	26.48	28.18	30.62	29.45	30.59	29.92	28.38	
11:00	19.18	22.45	22.90	26.73	28.57	31.05	29.58	30.68	30.31	28.65	
11:30	19.71	23.52	23.46	27.12	28.76	31.20	29.75	30.86	30.24	28.68	
12:00	20.08	23.71	23.80	27.13	28.96	31.38	29.93	30.88	30.07	28.59	
12:30	20.59	23.91	24.08	27.01	28.83	31.35	30.15	30.54	29.71	28.27	
13:00	20.83	24.01	24.05	26.90	29.10	31.41	30.01	30.29	29.56	27.80	
13:30	20.79	24.05	24.25	26.75	28.99	31.40	29.67	30.26	29.56	27.45	
14:00	20.89	24.09	24.24	26.54	28.29	31.59	29.45	30.05	29.33	27.44	
14:30	20.93	23.74	24.03	26.41	28.43	31.42	29.29	29.81	29.02	27.15	
15:00	20.91	23.45	23.81	26.28	28.46	31.24	29.14	29.72	28.56	26.98	
15:30	20.85	23.19	23.45	26.13	28.35	31.14	29.04	29.40	28.12	26.86	
16:00	20.56	22.77	23.08	25.88	28.10	30.83	28.82	29.27	27.92	26.75	

16:30	20.22	22.44	22.76	25.67	27.95	30.56	28.52	28.83	27.78	26.38
17:00	19.81	21.92	22.39	25.24	27.63	30.21	28.00	28.58	27.32	25.98
17:30	19.22	21.52	22.05	24.94	27.33	29.88	27.90	28.13	26.88	25.49
18:00	18.57	20.84	21.71	24.54	26.96	29.31	27.58	27.66	26.39	25.08
18:30	18.00	20.37	21.37	24.05	26.34	28.59	27.11	27.11	26.01	24.81
19:00	17.60	19.69	21.05	23.66	25.85	27.98	26.61	26.72	25.68	24.63
19:30	17.34	19.14	20.79	23.32	25.55	27.48	26.29	26.46	25.48	24.55
20:00	17.07	18.78	20.50	23.00	25.36	27.15	26.08	26.17	25.38	24.38
20:30	16.84	18.47	20.16	22.75	25.27	26.77	25.97	26.03	25.27	24.32
21:00	16.46	18.13	19.84	22.66	25.12	26.51	25.85	25.99	25.16	24.26
21:30	16.29	17.86	19.61	22.50	24.98	26.29	25.74	25.87	25.12	24.15
22:00	16.09	17.57	19.43	22.39	24.79	26.05	25.71	25.83	25.01	24.04
22:30	15.89	17.31	19.23	22.17	24.69	25.91	25.61	25.70	24.95	24.01
23:00	15.60	17.19	19.04	21.98	24.63	25.74	25.52	25.64	24.91	24.01
23:30	15.37	17.04	18.83	21.83	24.58	25.81	25.48	25.57	24.83	23.84

時間	屏東試驗地相對溼度 (%)									
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
00:00	83.42	75.59	77.07	75.46	79.00	80.05	79.89	80.76	80.73	85.31
00:30	83.57	75.84	77.64	75.58	79.33	77.66	79.98	80.80	80.78	85.14
01:00	84.05	76.24	77.69	75.78	79.12	77.50	80.00	81.02	81.05	82.42
01:30	84.31	76.21	77.95	75.81	79.16	76.88	83.00	81.07	80.86	82.49
02:00	84.60	76.32	78.20	76.27	79.17	76.54	80.22	80.95	80.42	82.31
02:30	84.77	76.58	77.87	76.21	79.15	76.11	79.98	80.63	80.33	82.68
03:00	84.91	76.78	78.87	76.35	79.04	75.92	79.79	80.28	80.67	82.80
03:30	84.97	76.75	79.07	76.15	82.01	75.72	79.80	80.24	80.57	82.94
04:00	84.88	77.11	78.87	76.22	81.83	75.98	79.80	79.97	83.50	83.00
04:30	85.07	77.24	78.92	76.68	79.04	75.52	79.95	79.60	80.55	83.09
05:00	85.00	77.48	79.10	76.93	79.31	75.62	80.00	79.27	80.53	83.16
05:30	85.00	77.26	79.52	76.67	79.55	75.21	80.30	79.40	80.48	83.38
06:00	85.01	77.34	79.61	76.70	79.36	75.36	79.83	79.03	80.44	86.12
06:30	85.11	77.34	79.51	76.26	77.96	71.75	78.99	77.75	79.09	82.89
07:00	85.80	77.29	78.97	73.32	76.62	67.98	76.20	74.63	77.09	81.34
07:30	85.36	76.79	75.61	69.46	74.83	64.40	73.66	71.28	74.20	80.61
08:00	83.56	74.44	72.67	65.96	72.28	62.56	71.92	67.40	70.96	74.66
08:30	81.35	72.06	70.22	63.08	70.84	60.43	70.12	63.95	68.18	71.93
09:00	79.17	69.30	68.39	60.39	69.10	59.57	67.68	61.58	65.06	72.04
09:30	76.12	66.55	65.85	58.53	67.67	57.28	66.59	59.35	63.38	67.00

10:00	72.35	64.16	62.63	56.93	67.44	56.39	65.39	57.84	61.17	65.69
10:30	69.22	62.20	60.92	55.38	67.31	56.09	63.44	58.99	59.87	67.20
11:00	67.46	60.88	60.18	54.60	66.50	55.17	63.52	57.35	57.74	66.48
11:30	65.79	59.94	58.68	53.54	65.84	54.41	63.28	57.51	59.15	64.28
12:00	64.67	57.75	57.78	55.00	65.70	55.31	63.46	58.04	61.38	64.27
12:30	63.76	57.64	56.90	55.94	65.89	56.42	62.87	60.07	63.24	66.93
13:00	63.11	57.47	57.21	56.69	65.31	55.59	63.18	63.89	64.61	69.27
13:30	63.85	57.52	57.33	57.46	65.66	55.87	65.20	62.43	64.53	70.37
14:00	63.17	57.83	57.54	58.14	66.88	55.46	65.71	63.91	65.63	70.08
14:30	63.02	58.97	58.50	58.50	66.70	55.50	66.48	65.17	66.23	73.03
15:00	63.30	59.69	59.32	58.26	66.28	56.37	67.50	65.11	68.40	74.24
15:30	63.88	60.40	60.94	59.12	66.68	56.26	67.47	65.97	70.02	72.16
16:00	64.98	61.42	62.46	59.45	66.24	57.69	68.51	66.71	71.32	75.92
16:30	66.13	62.16	63.64	60.44	66.93	59.14	69.84	68.28	71.67	77.13
17:00	67.77	63.37	64.84	62.02	67.85	60.86	71.58	68.75	74.02	78.32
17:30	69.89	65.27	65.97	63.19	69.36	62.14	72.30	70.76	76.07	79.85
18:00	73.33	66.45	66.96	64.86	70.54	64.35	73.19	72.86	78.33	81.55
18:30	75.94	67.32	68.60	66.76	72.59	67.46	78.03	75.47	79.73	82.78
19:00	77.63	68.40	69.97	68.58	74.81	70.03	77.98	77.35	80.74	83.41
19:30	78.85	69.79	71.63	70.45	75.67	72.39	79.34	77.94	81.09	83.63
20:00	79.52	71.30	72.75	72.29	76.74	73.91	80.10	79.34	80.91	84.26
20:30	80.08	71.81	72.92	73.30	77.01	75.56	80.63	80.08	81.11	84.38
21:00	81.14	72.33	74.37	73.53	80.06	76.34	80.54	80.16	81.26	84.23
21:30	81.48	73.10	74.55	73.98	77.62	77.16	81.05	80.30	81.08	84.56
22:00	82.06	73.69	75.08	74.47	80.64	77.38	80.95	80.27	81.05	84.54
22:30	82.49	73.99	75.62	75.28	78.20	77.42	80.89	80.71	81.16	84.62
23:00	83.16	74.18	76.09	75.66	78.51	77.78	80.95	80.72	81.24	84.22
23:30	83.47	74.51	76.81	75.83	79.23	77.12	80.52	80.43	84.12	87.19

時間	屏東試驗地土溫 (°C)									
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月

00:00	19.28	23.05	24.66	25.82	28.02	28.54	27.39	27.36	26.24	25.76
00:30	19.17	22.89	24.50	25.65	27.90	28.43	27.33	27.29	26.20	25.75
01:00	19.05	22.72	24.33	25.49	27.77	28.31	27.28	27.27	26.16	25.78
01:30	18.94	22.57	24.19	25.35	27.66	28.21	27.21	27.24	26.12	25.77
02:00	18.85	22.41	24.03	25.21	27.55	28.12	27.15	27.20	26.07	25.76
02:30	18.71	22.27	23.90	25.08	27.43	28.03	27.07	27.19	26.03	25.73
03:00	18.63	22.13	23.78	24.96	27.34	27.95	27.02	27.13	26.00	25.67
03:30	18.59	21.99	23.66	24.84	27.25	27.87	26.97	27.08	25.96	25.66
04:00	18.54	21.86	23.56	24.74	27.18	27.78	26.92	27.04	25.91	25.64
04:30	18.48	21.74	23.46	24.63	27.11	27.69	26.85	27.00	25.88	25.58
05:00	18.42	21.62	23.35	24.51	27.05	27.62	26.79	26.95	25.85	25.54
05:30	18.36	21.51	23.25	24.40	27.00	27.53	26.75	26.91	25.81	25.54
06:00	18.31	21.40	23.17	24.30	26.96	27.47	26.71	26.85	25.76	25.48
06:30	18.24	21.31	23.11	24.23	26.99	27.46	26.73	26.78	25.72	25.41
07:00	18.13	21.21	23.06	24.24	27.03	27.50	26.80	26.79	25.75	25.41
07:30	17.89	21.13	23.04	24.31	27.10	27.63	26.91	26.80	25.79	25.41
08:00	18.06	21.13	23.10	24.43	27.21	27.79	27.03	26.88	25.86	25.45
08:30	18.06	21.15	23.23	24.69	27.40	27.96	27.21	26.97	25.95	25.53
09:00	18.22	21.35	23.51	25.06	27.67	28.13	27.44	27.07	26.05	25.62
09:30	18.51	21.54	23.81	25.51	27.92	28.37	27.69	27.16	26.17	25.71
10:00	18.77	21.78	24.18	26.08	28.23	28.74	27.98	27.27	26.28	25.81
10:30	19.13	22.29	24.63	26.68	28.46	28.98	28.25	27.39	26.39	25.87
11:00	19.35	22.81	25.10	27.24	28.66	29.21	28.54	27.58	26.55	25.97
11:30	19.83	23.61	25.55	27.77	28.87	29.42	28.74	27.72	26.67	26.08
12:00	20.22	24.25	26.05	28.25	29.11	29.67	28.93	27.84	26.81	26.15
12:30	20.65	24.79	26.52	28.66	29.41	29.87	29.04	27.94	26.95	26.26
13:00	21.06	25.33	26.96	28.99	29.67	30.33	29.17	28.03	27.05	26.30
13:30	21.56	25.84	27.35	29.26	29.92	30.85	29.35	28.14	27.10	26.44
14:00	21.78	26.29	27.46	29.52	30.17	30.95	29.38	28.24	27.16	26.38
14:30	21.94	26.62	27.63	29.74	30.31	30.97	29.39	28.33	27.22	26.40
15:00	22.10	26.82	27.77	29.84	30.36	31.00	29.38	28.36	27.20	26.39
15:30	22.14	26.93	27.87	29.87	30.35	30.97	29.34	28.37	27.16	26.36
16:00	22.30	26.93	27.82	29.81	30.41	30.92	29.23	28.35	27.13	26.47
16:30	22.14	26.85	27.68	29.70	30.41	30.89	29.12	28.29	27.10	26.43
17:00	21.81	26.69	27.49	29.52	30.30	30.79	29.00	28.23	27.04	26.38
17:30	21.78	26.48	27.25	29.26	30.16	30.64	28.86	28.18	26.98	26.33
18:00	21.77	26.16	26.98	28.97	29.97	30.48	28.73	28.10	26.93	26.27
18:30	21.73	25.90	26.71	28.65	29.77	30.30	28.59	27.99	26.87	26.21
19:00	21.53	25.58	26.43	28.35	29.57	30.11	28.46	27.92	26.81	26.14

19:30	21.24	25.28	26.18	28.07	29.37	29.92	28.34	27.80	26.75	26.07
20:00	20.98	25.00	25.95	27.78	29.18	29.73	28.22	27.73	26.69	26.03
20:30	20.55	24.73	25.73	27.52	28.96	29.53	28.08	27.68	26.64	26.10
21:00	20.31	24.48	25.52	27.30	28.79	29.38	27.97	27.61	26.58	25.91
21:30	20.13	24.23	25.30	27.11	28.64	29.23	27.91	27.56	26.53	25.87
22:00	19.94	24.01	25.13	26.90	28.47	29.07	27.84	27.51	26.47	25.84
22:30	19.75	23.80	24.95	26.70	28.31	28.94	27.75	27.46	26.43	25.80
23:00	19.61	23.60	24.79	26.48	28.18	28.82	27.65	27.43	26.39	25.75
23:30	19.38	23.42	24.65	26.28	28.13	28.68	27.54	27.39	26.35	25.72

附錄五 屏東試驗地歷年二氣化碳濃度(ppm)

2009 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月												
平均	380.5	371.3	382.1	388.5	384.7	385.1	388.9	405.5	389.1	399.3	370.5	352.8
最大	378.8	370.0	352.5	449.4	449.1	440.1	481.8	725.9	535.7	586.3	586.1	468.6
最小	380.5	371.3	382.1	358.8	356.8	354.8	327.5	349.7	361.2	348.7	330.1	238.3
2010 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月												
平均	362.5	392.7	385.9	386.3	394.2	392.2	395.8	401.3	411.2	410.3	396.1	400.0
最大	428.1	446.4	442.2	441.6	445.7	487.4	517.1	645.5	767.3	585.1	499.2	521.1
最小	312.7	365.5	358.7	341.4	367.5	353.9	356.4	358.2	355.8	368.3	370.7	291.9
2011 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月												
平均	404.82	393.39	378.92	392.96	398.64	393.63	398.89	397.81	400.02	410.09		
最大	455.65	483.76	498.75	504.97	484.81	496.35	488.07	490.08	497.36	491.10		
最小	364.46	331.22	336.81	364.76	361.16	358.69	351.86	359.66	360.21	361.70		

100 年度委託研究計畫期中報告委員審查意見辦理情形表
計畫編號：100-00-5-16
計畫名稱：屏東地區造林樹種生長監測及碳吸存效益分析

審查委員意見	辦理情形
臺灣大學郭教授幸榮： 1. 本研究在森林固碳能力資訊的建立有其必要性。 2. 區域性交通、工廠等活動及東北季風的影響是否會干擾測值？如何排除？ 3. 林分的生長及蓄積為碳吸存的結果，本研究是否有規劃依林分生長及蓄積來推估固碳能力？並與本研究所推定之固碳能力與以連結？ 4. 本研究為延續性計畫，建議在期末報告時將前期的成果予以摘述。 5. 建議加強蒐集國外森林固碳能力之相關研究。	1.感謝委員建議 2.通量塔監測範圍內道路車輛極少，對測值影響不大；鄰近的砂石場位於南方，但由風向資料可知主要貢獻區來自東北方，對測值影響不大。 3.目前持續蒐集資料，仍在整理當中 4.感謝委員建議，已在期末報告補上 5.感謝委員建議，已在期末報告補上
林業試驗所陳研究員財輝： 1. 本計畫與國際同步進行渦度相關之二氧化碳通量計測，極有監測調查之必要。 2. 目前全球量測森林對二氧化碳減量效果，仍以傳統的兩生長期間生物量的差異進行估算，本計畫未來有否可能比較兩種測定量的差異？ 3. 期中報告第 4 頁土肉桂遭截幹之調查值建議捨棄？ 4. 期中報告第 6 頁 1-6 月風向請再確認，1-3 月為東南向，而 4-6 月為東北向是否正確？	1.感謝委員建議 2.目前持續蒐集資料，仍在整理當中 3.已修改 4.1 月為東南向，2-3 月較不明顯，4-10 月為東北向
林業試驗所簡研究員慶德： 1. 缺摘要。 2. 渦度相關系統日趨穩定，未來將可獲得更多更精確的資料。 3. 雨量數據請於期末報告時加入。	1.已在期末報告補上 2.感謝委員建議 3.已在期末報告補上